



## **Injectie voor operatie onder lokale verdoving**

**Belangrijk: neem deze folder mee als u opgenomen wordt zodat eventuele onduidelijkheden met u kunnen worden besproken!**

# Injectie voor operatie onder lokale verdoving

## Inleiding

U krijgt een injectie ter verdoving van weefsels, zodat een operatieve ingreep kan worden uitgevoerd. Deze injectie gebeurt met verdovingsvloeistof. De verdoving werkt na enkele minuten en houdt enkele uren aan.

## Informatie over (de bijwerkingen van ) de gebruikte injectievloeistof

*Verdovingsvloeistof:* hiervoor wordt in het algemeen bupivacaïne (marcaïne) gebruikt. De werkingsduur is afhankelijk van de dosering. Bijwerkingen bij lokale verdoving zijn zeer zeldzaam en treden met name op indien de vloeistof per ongeluk in een bloedvat wordt ingespoten.

## Ingreep onder lokale verdoving

De informatie en instructies ten aanzien van de ingreep die u zal ondergaan vindt u in de, voor die ingreep specifieke, bijgevoegde informatiefolder. Sommige delen van die informatie zijn voor u echter niet van toepassing omdat u onder lokale verdoving geopereerd gaat worden. Hieronder treft u de informatie die in uw geval van toepassing is en de betreffende informatie uit de andere folder vervangt; de rest van de informatie uit de andere folder blijft wel voor u van toepassing.

## Anesthesie

De anesthesioloog van de betreffende operatielocatie zal geen consult met u voeren. U dient uw eigen medicatie gewoon door te gebruiken.

## De dag van de operatie

- *Eten/drinken:* u mag gewoon eten en drinken.
- *Opname:* u meldt zich op het afgesproken tijdstip in de kliniek. Vanuit de wachtkamer wordt u begeleid naar de voorbereidingsruimte. De orthopedisch chirurg komt bij u langs.
- *Operatie:* u wordt naar de operatiekamer gebracht. Er vindt een laatste controle plaats met het hele operatieteam. Na desinfectie wordt het gebied van de operatie verdoofd, waarna de operatie wordt uitgevoerd.
- *Na de operatie:* u wordt naar de voorbereidingsruimte teruggebracht. U krijgt een ontslagbrief mee waarop de belangrijkste informatie over de operatie en nabehandeling staat vermeld.

## Nabehandeling

- *Vervoer naar huis:* dient u zelf te regelen, waarschijnlijk kunt u niet zelf autorijden.

## Spoed

Redenen om met spoed contact op te nemen kunnen zijn:

- een nabloeding,
- onhoudbare pijn en/of
- tekenen van infectie (koorts),
- onbelastbaarheid van het geopereerde ledemaat,
- zwelling en/of
- uitvloed van troebel vocht/pus).

U kunt te allen tijde (24/7) contact opnemen via 06 – 3050 2133. U wordt eerst geholpen door een assistent. Zo nodig wordt een arts-assistent of medisch specialist ingeschakeld.

## Literatuur

<http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/b/bupivaca%C3%AFne.asp>.

## Gegevens kliniek

BeterGezond Klinieken

Website: [www.betergezond.net](http://www.betergezond.net)

Postadres: Kromgouw 78, 1352 BH ALMERE